

ARGYRANTHEMUM frutescens

(Na drugiej stronie **BACOPA – SUTERA**)

- Doniczkowanie:** Doniczki 10-12 cm: Początek lutego - początek marca.
- Substrat:** Substrat z dodatkiem gliny, perlitu lub granulek styropianu; pH około 5,8-6,2.
- Uszczykiwanie:** Tydzień po doniczkowaniu uszczykiwać miękkie wierzchołki. Można też to zrobić gdy rośliny są w paletach ok. 2 tyg. przed sadzeniem.
- Temperatura:** Po doniczkowaniu około 18-20°C; później 14-16°C. *Argyranthemum* nadaje się tylko w ograniczony sposób do uprawy zimnej, ale dobrze reaguje na negatywny DIF/„Cool Morning” (zimny poranek); przez co rośliny pozostają bardziej zwarte (kompaktowe). Niskie temperatury wspomagają indukcję kwitnienia.
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność, czasowe zasuszenie bryły korzeniowej prowadzi do żółknięcia liści.
- Nawożenie:** Żarłoczna! Nawozić płynnym nawozem wieloskładnikowym raz w tygodniu (0,2-0,3%) lub z każdym podlewaniem mniejszymi stężeniami (1,0-1,15%). Szczególnie podczas tworzenia pąków zapotrzebowanie na odżywkę jest duże. Blednięcia roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza (np. Tenso). Polecamy nawozy **PLANTON®K i S**.
- Skarlanie:** Zapotrzebowanie na środek skarłający zależy od odmiany; odmiany silnie rosnące mają duże zapotrzebowanie na środek skarłający. ‘Butterfly’ znajduje się w średnim zakresie. Dobre działanie wykazuje oprysk Topfloreem 0,05%, lub w podlewaniu w stężeniu 0,025%.
- Kwitnienie:** Od połowy kwietnia, oraz od końca kwietnia/początku maja w przypadku pozostałych odmian.
- Ochrona roślin:** Zwrócić uwagę i odpowiednio wcześniej zwalczać mączlika, mszyce, wciornastek i ziemiorkę. ‘Butterfly’ jest podatna na mączniak rzekomy i roztocza. Korzystne jest przeprowadzanie profilaktycznych oprysków. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Polecane do pojemników stojących na balkony, tarasy i na ogrodowe rabaty, sadzone pojedynczo lub w kompozycjach z innymi roślinami.
- Wskazówki dla konsumenta:** Zwrócić uwagę na niemałe zapotrzebowanie na wodę, i nawożenie. Przekwitłe kwiaty należy usuwać.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą oraz są sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

BACOPA – SUTERA

(Na drugiej stronie *ARGYRANTHEMUM frutescens*)

- Doniczkowanie:** Doniczki 10-12 cm: Początek lutego - początek marca.
Ample 20-25cm: Początek stycznia - połowa lutego (po 3-4 rośliny).
- Substrat:** Substrat z dodatkiem gliny lub perlitu; pH około 5,5-5,8.
- Uszczykiwanie:** Po posadzeniu do doniczek.
- Temperatura:** Po doniczkowaniu około 18-20°C; później 14-16°C. Po ukorzenieniu szeroki zakres tolerowanej temperatury. DIF/Cool Morning (zimny ranek) poprawia jakości zmniejsza zapotrzebowanie na środek skarłający.
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność. Substrat nie może ulec wysuszeniu ponieważ może zrzucić pąki kwiatowe.
- Nawożenie:** Roślina o średnich wymaganiach pokarmowych. Po ukorzenieniu zaleca się co tygodniowo nawozić nawozem wieloskładnikowym w płynie (stężenie 0,2%) np. **PLANTON@K**. Wyblaknięcia liści roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza zawartym w nawozie **PLANTON@S**.
- Skarlanie:** Raczej unikać skarłania retardantem, stosować zimny poranek, odwrócony DIF, niską temperaturę.
- Kwitnienie:** Od połowy kwietnia.
- Ochrona roślin:** Zwrócić uwagę i odpowiednio wcześniej zwalczać mączlika szklarniowego, wciornastka i Botrytis – zgnilizne pędów. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Znakomicie nadaje się do kombinacji z wszystkimi roślinami rabatowymi i balkonowymi.

Wskazówki dla konsumenta: Sutura 'Snowflake' jest niewymagającą, długo kwitnącą rośliną do ampli, skrzynek balkonowych i jako roślina okrywająca. SuturaNova 'White' wykazuje silnie wiszący wzrost i jest wyraźnie lepiej rosnąca, tęższa o większych kwiatach niż stara 'Snowflake'. Bacopy z serii Sutura Nova rosną bardziej krzaczasto, ale mają tendencję do przerwy w kwitnieniu przy wysokich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na to, że czasowe zasuszenie bryły korzeniowej Sutura źle znosi.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

SuturaNova jest prawnie chroniona i nie może być namnażana dodatkowo do celów produkcyjnych.

Proven Winners[®] i **SuturaNova**[®] są zarejestrowanymi Znakami Towarowymi.