

## CALIBRACHOA

Serie: MILION BELLS® i SUPERBELLS®

(Na drugiej stronie CALOCEPHALUS)

- Doniczkowanie:** Ample 21-25 cm: od połowy lutego do początku marca (3-4 młode rośliny/amplę).  
Doniczki 10-12 cm: od początku do końca marca. (kwiaty z początkiem maja).
- Substrat:** Torfowy z domieszką perlitu o pH 5,5-5,8.  
Nie stosować 'ciężkiego' zbitego substratu.
- Uszczykiwanie:** Uszczykiwanie po ok. 1 tygodniu od Doniczkowanie lub . Towar, który stał się za długi  
można uszczykiwać powtórnie.
- Temperatura:** Po doniczkowaniu przez 2-3 tygodnie 18-20°C, później obniżyć temperaturę do 16°C aby towar uzyskał dobrą jakości nie był zbyt wyciągnięty. Na samym końcu można obniżyć 10-12°C.
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Równomierne, ale utrzymywać umiarkowaną wilgotność. Zalanie lub nadmierna wilgotność podłoża ( substratu ) może prowadzić do gnicia korzeni. Delikatna bryła korzeniowa!
- Nawożenie:** Roślina o średnich wymaganiach pokarmowych. Zasilac z każdym podlewaniem nawozem o stężeniu 0,1-0,15%, lub raz w tygodniu nawozami w stężeniu 0,2-0,3% Blednięcia roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza. Polecanym przez nas nawozem jest **PLANTON®S**.
- Skarlanie:** Dla uprawy doniczkowej niezbędne. Doniczki przynajmniej 1x około 10 dni po uszczykiwaniu ( w razie potrzeby i kilka razy powtórzyć) spryskać retardantem skarłającym. Skarlanie przeprowadzić odpowiednio wcześniej. Z innych metod polecamy ujemny DIF, zimny poranek.
- Kwitnienie:** Od połowy kwietnia (kwiaty pozostają również otwarte przy słabym oświetleniu).
- Ochrona roślin:** **Uwaga na mszyce-odpowiednio wcześniej zwalczać.** W przypadku zalania mogą wystąpić choroby korzeni jak np.: Thielaviopsis (szczególnie u końcowego odbiorcy!); zaleca się oprysk profilaktyczny fungicydem. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Wirusy:** Wirusy mogą spowodować znaczne problemy podobnie jak przy innych Surfiniach, Conchitach i Petuniach.
- Zastosowanie:** **MILLION BELLS® i SUPERBELLS®** można łatwo kombinować z innymi produktami amplach, kubłach i w skrzynkach balkonowych o ile warunki co do miejsca (pełne słońce), niskiego pH i nawożenia są podobne.

**Ochrona odmian:** Wszystkie odmiany **MILLION BELLS® SUPERBELLS®** są w Polsce prawnie chronione i nie mogą być bez zgody właściciela licencji (Suntory Ltd.) rozmnażane do celów produkcyjnych. Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

## CALOCEPHALUS

(Na drugiej stronie CALIBRACHOA)

- Doniczkowanie:** Polecamy sadzenie do doniczek 9-12cm po jednej sadzonce.
- Substrat:** Podłoże przepuszczalne o pH ok. 5,5.
- Uszczykiwanie:** 1-2 razy na początku uprawy.
- Temperatura:** Początkowo dla przekorzenia 20°C dzień/18 °C noc, potem 15 °C.
- Światło:** Stanowisko słoneczne, półcieniste.
- Podlewanie:** Umiarkowane, nie zalewać roślin.
- Nawożenie:** Początkowe nawożenie z przewagą fosforu później azotu.
- Skarlanie:** Brak
- Kwitnienie:** Brak – ozdobna z liści.
- Ochrona roślin:** Przy nieodpowiedniej wilgotności mogą się pojawić problemy z Botrytis, Phytium. Każdy pojawiający się szkodnik lub choroba powinny być do razu zwalczane dostępnymi na rynku chemicznymi środkami ochrony roślin. W sprawie środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do stosowania proszę się porozumieć z przynależną dla siedziby Waszej firmy Stacją Kwarantanny Roślin.
- Zastosowanie:** Doskonała jako wypełnienie pomiędzy innymi kwitnącymi roślinami, ciekawa kolorystyka do kompozycji.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

Prosimy o wykazanie zrozumienia, że nie możemy gwarantować pełnego sukcesu w uprawie, ponieważ nie mamy wpływu na warunki uprawy w poszczególnych zakładach.