

## PELARGONIA

(Na drugiej stronie SUPERCAL)

- Doniczkowanie:** Doniczki 10-12 cm (zbyt duże opóźniają kwitnienie), nie sadzić zbyt głęboko (do wysokości bryły korzeniowej), aby rośliny nie chorowały.
- Substrat:** Substrat torfowy z domieszką gliny, zalecane pH podłoża 5,5-6,0
- Uszczykiwanie:** Pelargonii rabatowej z założenia nie uszczykuje się, ewentualne przyłamanie dla mocniejszego rozkrzewienia, ale nie późniejsze niż koniec lutego początek marca. Pelargonie bluszczolistne, zwłaszcza odmiany Ville de Paris i peltatum wymagają przełamywania, które należy wykonać po posadzeniu roślin do doniczek ( ok.7-10 dni po posadzeniu ), ale nie później niż do połowy marca, co gwarantuje otrzymanie kwitnących roślin do połowy maja.
- UWAGA! Należy pamiętać, że uszczykiwanie opóźnia kwitnienie o około 2-3 tygodnie.**
- Nawożenie:** Około 7-10 dni po posadzeniu ( kiedy widoczne są pierwsze korzenie przerastające bryłę korzeniową – zaobserwować po wybiciu całej rośliny z doniczki ) należy rozpocząć regularne nawożenie roślin nawozami o prawidłowym stosunku podstawowych składników pokarmowych N:P:K wzbogaconymi również mikroelementami ( zalecany Planton® K w stężeniu 0,1-0,15%, saletra wapniowa),. Pelargonie należą do roślin raczej żarłocznych.
- Temperatura:** Zaraz po wysadzeniu roślin do doniczek należy podnieść temperaturę do 20°C dla szybkiego przekorzenia się roślin, później obniżyć temperaturę i utrzymywać ją na poziomie 16°C nocą i 18°C dniem, by na 2-3 tygodnie przed sprzedażą obniżyć ją do 14°C nocą i 16°C dniem, co powoduje szybki wzrost i obfitsze kwitnienie. Pelargonie pozytywnie reagują na metodę chłodnego poranka (Cool Morning).
- Światło:** Pełne nasłonecznienie.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność, nie przelewać roślin, unikać moczenia liści szczególnie podczas upałów.
- Skarlanie:** Zalecanym i najczęściej stosowanym retardantem wzrostu jest CCC dostępny na rynku pod nazwą CYCOCEL. Rośliny przed zastosowaniem retardantów 0,1, 0,2 ,0,3 CCC 760 wzrostu muszą być dobrze podlane, a liście suche. Zalecane jest użycie substancji wzrostowych w formie oprysku dolistnego (najlepiej w godzinach porannych), którego nie można wykonywać przy silnym słońcu i temperaturze powyżej 20°C, gdyż środek nie działa lub jego działanie jest znacznie osłabione. Stężenie Cycocelu ( CCC 760 )
- Pelargonie VDP – 0,3 % (w zależności od wyglądu roślin 2-3 krotnie)
  - Pelargonie bluszczolistne i zonale silnie rosnące 0,2 % (w zależności od wyglądu roślin 2-3 krotnie)
  - Pelargonie o wzroście kompaktowym skarłać 1-2 razy 0,1% lub wcale w zależności od wyglądu roślin
- Ochrona roślin:** Przed posadzeniem roślin na miejsce stałe należy pamiętać o dokładnej dezynfekcji szklarni ze względu na dużą wrażliwość pelargonii na bakterie Xanthomonas. Odkazić stoły, maty, narzędzia Floradesem lub Agrigermem. Bezpośrednio po posadzeniu rośliny podlać środkiem grzybobójczym najlepiej-Previcur w stężeniu 0,15%. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Pelargonie bluszczolistne znakomite do skrzynek balkonowych i pojemników wiszących, pelargonie rabatowe na rabaty, a także do pojemników stojących w ogrodach i na tarasach.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

## PETU-BRACHOA

seria Supercal

(Na drugiej stronie PELARGONIA)

- Doniczkowanie:** Doniczki Ø10-12 cm.
- Substrat:** Torfowy z dodatkiem gliny lub perlitu o pH 5,5-6,8.
- Uszczykiwanie:** Dla rozkrzewienia przyciąć po posadzeniu do doniczek. W razie rozpięchłego pokroju należy uszczyknąć drugi raz. Odmiany szybko rosnące mają tendencję do wyciągania się.
- Temperatura:** 18-20°C podczas przekorzeniania się, potem prowadzić w niższych temperaturach 10-12. Na koniec można również obniżyć do 8-10°C aby towar handlowy nie wyciągnął się.
- Światło:** Pełne słońce, nie cieniować. Sadzone w gruncie mają znacznie lepsze wybarwienie (szczególnie odmiana Terracota).
- Podlewanie:** Wysokie wymagania wodne. Podleając oszczędnie można regulować wzrost (pokrój rośliny).
- Nawożenie:** Rośliny żarłoczne. Zasilac z każdym podlewaniem stężeniem 0,1% lub raz w tygodniu stężeniem 0,2-0,3%. Polecany nawóz do surfinii **PLANTON®S**.
- Skarlanie:** Dla ograniczenia wzrostu stosować retardanty : Topflor 0,05% lub Cycocelem 0,15%, odwrócony DIF, zimny poranek.
- Kwitnienie:** Roślina kwitnie nieprzerwanie od połowy kwietnia przez całe lato. Kwiaty bez cech lepkości i prawie tak duże jak u surfinii.
- Ochrona roślin:** Roślina podatna na mszyce. W sprawie środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do stosowania proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** **PETU BRACHOA®** można łatwo kombinować z innymi produktami amplach, kubłach i w skrzynkach balkonowych o ile warunki co do miejsca (pełne słońce), niskiego pH i nawożenia są podobne.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

**Ochrona odmian:** Wszystkie odmiany **PETU-BRACHOA®** są w Polsce prawnie chronione i nie mogą być bez zgody właściciela licencji rozmnażane do celów produkcyjnych.