

SCAEVOLA aemula

(Na drugiej stronie SENETTI)

- Doniczkowanie:** Polecamy sadzenie do doniczek o średnicy 12cm lub do koszy
- Substrat:** Torfowy pH - 5,5-5,8.
- Uszczykiwanie:** Po posadzeniu uszczyknąć dla lepszego rozkrzewienia.
- Temperatura:** Temperatura - po posadzeniu 18-22°C, później 10-16°C.
- Światło:** Pełne nasłonecznienie.
- Podlewanie:** Regularne podlewanie, nie toleruje zbyt mocnego i długotrwałego zalewania bryły korzeniowej.
- Nawożenie:** Wymaga nawożenia kilka razy w tygodniu nawozem wieloskładnikowym np. **PLANTON®S** lub **K**.
- Skarlanie:** Ujemny DIF, niska temperatura, zimny poranek, również można skarłać retardantami.
- Kwitnienie:** Kwitnie nieprzerwanie do pierwszych przymrozków.
- Ochrona roślin:** W sprawie środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do stosowania proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Możliwości kombinacyjne:** Doskonała propozycja do zestawień z innymi roślinami, zarówno do gruntu jak i w donicach do sadzenia na obrzeżach przybiera zwisający pokrój.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

SENETTI® *Cyneraria* – popielnik
(Na drugiej stronie SCAEVOLA)

- Doniczkowanie:** Doniczki 12cm na wiosenną sprzedaż sadzenie od końca stycznia.
- Substrat:** Substrat torfowy z dodatkiem gliny lub perlitu pH- 5,5-6,0.
- Uszczykiwanie:** Tydzień po posadzeniu, raz uszczyknąć.
- Temperatura:** Przez 3-4 tygodni od posadzenia 18-20 °C dla wzrostu wegetatywnego. Późniejsza uprawa chłodniejsza przy temperaturze 10-14 °C.
- Światło:** Pełne światło. Najlepszą jakość osiągają przy dużej intensywności światła.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność; w fazie chłodnej prowadzić bardziej sucho.
- Nawożenie:** Względnie żarłoczna! Po ukorzeniu nawozić z każdym podlewaniem płynnym nawozem wieloskładnikowym 0,1-0,15% (np.**PLANTON® K**). W nawożeniu uwzględnić należy duże zapotrzebowanie cynerarii na żelazo. W przypadku chlorozy zastosować chelat żelazowy (np.Tenso zawarte w **PLANTONIE® S**).
- Skarlanie:** W 1-2 tygodniu po uszczykiwaniu pierwszy oprysk retardantem, dalsze zabiegi po fazie chłodnej. Zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie w zależności od potrzeb i wielkości roślin.
- Kwitnienie:** Przy średniej temperaturze dnia 14°C, bliskiej optymalnym wymaganiom cynerarii, zakwitają po 10 tygodniach od posadzenia do doniczek. Wcześniejsze kwitnienie możliwe przy zastosowaniu oświetlenia asymilacyjnego.
- Ochrona roślin:** Dotychczas zaobserwowano następujące potencjalne zagrożenia w ochronie roślin: Mączniak (prawdziwy i rzekomy). Szkodniki: gąsienice, wciornastki, mszyce. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Jako kwitnąca roślina doniczkowa przeznaczona do sprzedaży wczesną wiosną (marzec –kwiecień). Zalecana jako roślina rabatowa i balkonowa. Pojedyncze kwiaty wytrzymują ponad dwa tygodnie; nie zamykają się na nocą.
- Zalecenia dla konsumenta:** Stanowisko chłodne i jasne, ale nie konieczne. Regularnie nawozić i utrzymywać równomierną wilgotność. Przekwitnięte kwiatostany usuwać, możliwe również przycięcie po pierwszym kwitnieniu.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

SENETTI® jest zarejestrowanym Znakiem Towarowym.
Wszystkie odmiany **SENETTI®** są prawnie chronione i dlatego nie mogą być dodatkowo namnażane.